

Allegato 8 - Scheda sintetica delle vaccinazioni indicate ai soggetti a rischio per esposizione professionale

| Vaccinazione anti-epatite A | Vaccinazione anti-epatite B | Vaccinazione antinfluenzale |
|---|--|---|
| <p>Soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavorano a contatto con primati infettati dal virus dell'Epatite A (HAV) - lavorano con HAV in strutture laboratoristiche | <ul style="list-style-type: none"> - Personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale e personale del Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso, assistenza sanitaria nelle carceri - Soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità - Persone che si rechino per motivi di lavoro in aree geografiche ad alta endemia di HBV - Addetti al soccorso e al trasporto di infortunati e infermi - Personale di assistenza in centri di recupero per tossicodipendenti - Personale di istituti che ospitano persone con disabilità fisiche e mentali - Personale addetto alla lavorazione degli emoderivati - Personale religioso che svolge attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria - Personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, Comandi Municipali dei Vigili Urbani, appartenenti al Corpo forestale dello Stato - Addetti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Tatuatori e <i>body piercers</i> - Addetti al lavaggio di materiali potenzialmente infetti - Addetti ai servizi cimiteriali e funebri - Lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza | <p>Categorie di lavoratori indicate nella circolare annuale sulla prevenzione e controllo dell'influenza:</p> <p>Medici e personale sanitario di assistenza.</p> <p>Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forze di polizia - Vigili del fuoco - Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolanti allo svolgimento della loro attività lavorativa - Lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività (è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro a tale categoria di lavoratori) <p>Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allevatori - addetti all'attività di allevamento - addetti al trasporto di animali vivi - macellatori e vaccinatori - veterinari pubblici e libero-professionisti |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | e del pronto soccorso aziendale | |
|--|---------------------------------|--|

| Vaccinazione anti-Morbillo-Parotite-Rosolia | Vaccinazione anti-pertosse (dTaP) | Vaccinazione anti-varicella |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le donne suscettibili esposte ad elevato rischio professionale, in particolare le lavoratrici in asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado - Tutti gli operatori sanitari suscettibili | <ul style="list-style-type: none"> - Operatori dei reparti coinvolti nell'assistenza al neonato - Operatori degli asili nido - Tutte le altre figure che accudiscono il neonato | <p>Persone suscettibili che lavorano in ambiente sanitario. Prioritariamente la vaccinazione dovrebbe essere eseguita dal personale sanitario che è a contatto con neonati, bambini, donne gravide o con persone immunodepresse.</p> <p>Operatori scolastici suscettibili (il ricordo anamnestico ha, per quanto riguarda la varicella, valori predittivi molto elevati) che sono a contatto con neonati e bambini e operano nei seguenti ambienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asili nido - scuole dell'infanzia - scuole primarie - scuole secondarie |

| Vaccinazione anti-tubercolare (BCG) | Vaccinazione anti-meningoencefalite da zecca (TBE) | Vaccinazione anti-rabbica |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Operatori sanitari, studenti di medicina e delle lauree sanitarie, specializzandi di area medico-chirurgica individuati da un piano di valutazione del rischio ex artt. 2, 17, 279 e 304 del D.lgs. 81/2008 - Soggetti individuati da un piano di valutazione del rischio ex artt. 2, 17, 279 e 304 del D.lgs. 81/2008 che prestano assistenza ai soggetti fragili anche al di fuori delle strutture sanitarie | <p>Soggetti professionalmente esposti, in particolare lavoratori in aree endemiche e in zone rurali e boschive (es. contadini, militari)</p> | <p>Profilassi pre-esposizione consigliata a tutti i lavoratori a continuo rischio di esposizione al virus della rabbia, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale di laboratorio che lavora a contatto con tale virus - veterinari - biologi - stabularisti - operatori di canili - altri lavoratori a contatto con animali potenzialmente infetti |