

Codici	Antidoti		ESTERO	Indicazioni Terapeutiche	Classe di Priorità	Modalità di Conservazione e Trasporto.	Ulteriori indicazioni	RCP Farmaco
	Principio Attivo	Forma farmaceutica						
V03AZ01	Alcol etilico 95°- 96°	Fiala 2ml - 10ml	NO	alcoli e glicoli	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Lontano da fiamma o fonti di calore.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Alcol Eilico. Scheda Medicamenta
V03AB22	Amile nitrito	Fiala da 1ml	SI	Maxiemergenze / SCORTA 118	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce. A contatto con l'aria e se mescolato con acqua si altera rapidamente	Maxiemergenza. Scorta in dotazione ai 118	Contattare il CAV
S01FA01	Atropina solfato	Fiala 0,5 mg/ml	NO	carbamati, esteri organofosforici , agenti nervini , ipertono colinergico (funghi del genere Clitocybe e Inocybe)	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Atropian Solfato. RCP AIFA
S01FA01	Atropina solfato	Fiala 1mg/ml	NO	carbamati, esteri organofosforici , agenti nervini , ipertono colinergico (funghi del genere Clitocybe e Inocybe)	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Contenitori ben chiusi e al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Atropina Solfato. RCP AIFA
B05XA02	Bicarbonato di sodio	Fiala 1mEq/ml	NO	alcalinizzante delle urine e plasma. Cardiotossicità da farmaci (chinidina e antidepressivi triciclici. Escrezione urina di farmaci (fenobarbitale e ac. Acetilsalicilico)	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Sodio Bicarbonato. RCP AIFA
V03AB17	Blu di metilene	Fiala da 100mg/10ml	NO	Sostanze metaemoglobinizzanti . Shock distributivo. Neurotossicità da ifosfamide.	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente e al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Blu di metilene. RCP AIFA
B05XA07	Calcio cloruro diidrato	Fiala da 1g/10ml	NO	ipocalcemie gravi per ingestione di fluoruri e ossalati (antriggine)	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente e al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio Cloruro. RCP AIFA
A12AA03	Calcio gluconato	Fiala da 10 ml al 10%	NO	ipocalcemie gravi per ingestione di fluoruri e ossalati (antriggine). PREPARAZIONE GALENICA CALCIUM GEL. PER CONTATTO CUTANEO CON OSSALATI O FLUORURI	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio Gluconato. RCP AIFA
X	Carbone vegetale attivato	barattolo da 1 Kg		Adsorbente specifico	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente e in luoghi asciutti	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Carbone Vegetale Attivato. Scheda Med

M03CA01	Dantrolene sodico	Flacone da 20 mg	NO	ipertermia maligna; sindrome maligna da neurolettici	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori ai 25°C. Non esporre alla luce diretta. Impiegare la soluzione entro 6 ore dalla ricostituzione. La soluzione ricostituita non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Dantrolene Sodico. RCP AIFA
V03AF02	Dexrazoxano cloridrato	10 Flaconcini da 500mg	NO	stravasato di antracicline	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. La stabilità chimica e fisica in uso di Cardioxane una volta ricostituito e successivamente diluito è di 4 ore a 25°C. Dal punto di vista microbiologico, Cardioxane una volta ricostituito e successivamente diluito deve essere usato immediatamente. Se il prodotto non è usato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione prima dell'uso ricadono sotto la responsabilità dell'utilizzatore e non devono superare le 4 ore a temperature comprese tra 2°C e 8°C (in frigorifero), al riparo dalla luce.	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti di Oncologia. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Dexrazoxano cloridrato.RCP AIFA
N05BA01	Diazepam	Fiala da 10mg/2ml	NO	Cloroquina,	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente	Seguire attentamente le disposizioni del CAV per la somministrazione	Diazepam. RCP AIFA
x	Dimetilsolfossido DMSO 99%	Soluzione al 99%	NO	stravasato di antracicline e stravasato di antibiotici non antraciclinici (mitomicina). SOLUZIONE AL 99%	1 (Entro 30 min.)	No conservare a temperature superiori a 25°C	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti di Oncologia. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Dimetilsolfossido-DMSO. Scheda Medic

B05BA02	Soluzioni Lipidiche al 20%	Sacca da 100-250-500-1000ml	NO	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardioattivi	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiore ai 25°C. Non congelare. Tenere i flaconcini al riparo dalla luce.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Soluzioni Lipidiche. RCP AIFA
B05BA02	Soluzioni Lipidiche 30 g/100 ml	Sacca da 250 ml	NO	Cardiotossicità refrattaria da agenti liposolubili, anestetici, farmaci cardioattivi	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiore ai 25°C. Non congelare. Tenere i flaconcini al riparo dalla luce.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Soluzioni Lipidiche. RCP AIFA
V03AB19	Fisostigmina salicilato	Fiala da 1mg/1ml o 2mg/5ml o 2mg/2ml	NO	sindrome anticolinergica	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Conservare al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Fisostigmina Salicilato. RCP AIFA
V03AB25	Flumazenil	Fiala da 1mg/10ml	NO	benzodiazepine	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Flumazenil. RCP AIFA
V03AB24	Frammenti anticorpali antidigitale	Flacone da 40mg	NO	digossina e glucosidi simil-digitalici	1 (Entro 30 min.)	Conservare a temperature tra 2°C e 8°C. NON TENERE IN FREEZER. Utilizzare la soluzione ricostituita entro 4 ore	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	DIGIFAB. Scheda Farmaco
H04AA01	Glucagone cloridrato	Fiala da 1mg/1ml	NO	beta bloccanti	1 (Entro 30 min.)	Conservare a temperature tra 2°C e 8°C. NON TENERE IN FREEZER.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Glucagone cloridrato. RCP AIFA
B06AA03	Ialuronidasi	Fiala da 1500UI/1ml	NO	stravaso di etoposide, alcaloidi della vinca e taxani	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori ai 25°C	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti di Oncologia. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Ialuronidasi. Scheda Farmaco

V03AB37	Idarucizumab	Flaconcino 2,5/50ml	NO	inattivatore specifico per dabigatran	1 (Entro 30 min.)	<p>Conservare a temperature tra 2°C-8°C. NON TENERE IN FREEZER.</p> <p>Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.</p> <p>Prima dell'uso, il flaconcino chiuso può essere tenuto a temperatura ambiente (fino a 30 °C) per un periodo massimo di 48 ore, se conservato nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. La soluzione non deve essere esposta alla luce per più di 6 ore (nel flaconcino chiuso e/o durante l'uso).</p>	<p>Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti Di Rianimazione. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.</p>	Idarucizumab. RCP AIFA
V03AB33	Idrossicobalamina	Flacone da 5g	SI	cianuri	1 (Entro 30 min.)	No conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire attentamente le disposizioni del CAV per la somministrazione	Idrossicobalamina. RCP AIFA
V03AB21	Ioduro di potassio	cps da 65mg e cps da 130mg	NO	Iodio Radioattivo	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Ioduro di Potassio. Scheda MEDICAMENTI
V03AB01	Ipecacuana sciroppo	Ipecacuana sciroppo	NO	Induzione dell'emese	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Preparazione Galenica
x	Sodio Solfato polvere	Busta da 2,5g e 10g	NO	Lassativo	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Sodio Solfato. Scheda MEDICAMENTI
X	Magnesio Solfato polvere	Busta da 30 gr	NO	Lassativo	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Preparazione Galenica

B05BC01	Mannitolo	Flacone 18% da 100 ml	NO	Intossicazione da Ciguatossina. Grave intossicazione da vitamina A. In alternativa atropina e pralidossina	1 (Entro 30 min.)	Conservare nella confezione originale e nel contenitore ermeticamente chiuso. Non refrigerare o congelare. La conservazione a temperatura inferiore a 20°C può provocare la formazione di un precipitato cristallino che si discioglie per riscaldamento in acqua calda.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Mannitolo. RCP AIFA
V03AB15	Naloxone cloridrato	Fiala da 0,4mg/ml	NO	OPPIOIDI	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. tenere al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Naloxone cloridrato. RCP AIFA
A06AA01	Paraffina liquida	Flacone da 200ml	NO	Derivati del Petrolio, solventi. Indicazioni non univoche	1 (Entro 30 min.)	Conservare al riparo dalla luce e dall'aria	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Paraffina Liquida. Scheda-MEDICAMEN
X	Polietilenglicole 400 (PEG400)	Flacone da 500ml o 1000ml	NO	Decontaminazione Cutanea da fenoli. Uso Topico	1 (Entro 30 min.)	Temperatura ambiente. Conservare al riparo dalla luce e dall'aria	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Preparazione Galenica
A06AD65	Polietilenglicole da 3350/4000 (PEG 3350—MACROGOL 3350/4000)	Busta da 70g	NO	Catarsi. Lavaggio intestinale	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. La soluzione ricostituita deve essere conservata a 2-8°C (in frigorifero) e usata entro 48 ore dalla preparazione. La soluzione residua deve essere eliminata.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Polietilenglicole 4000. RCP AIFA
V03AB14	Protamina	Fiala da 50mg/5ml	NO	EPARINA	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Protamina. RCP AIFA
V03AX13	Simeticone	Flacone da 6,66%	NO	sostanze schiumogene	1 (Entro 30 min.)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Simeticone -RCP AIFA
V03AB06	Sodio tiosolfato	Fiala da 1g/10ml	NO	Ingestione di Ipcloclorito (uso orale). Cianuri (uso Endovenoso). Stravasato di mecloretamina, oxaliplatino, cisplatino e carboplatino (uso Sottocutaneo). Contattare il CAV per la tipologia d'uso	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. Conservare al riparo dalla luce. Non congelare	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Sodio Tiosolfato. RCP AIFA
X	Terra di fuller	Terra di fuller	NO	Paraquat e Diquat. Uso Orale	1 (Entro 30 min.)	Contattare CAV	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare CAV

A11HA02	Piridossina cloridrato vit B6	Fiala da 300mg/2ml	NO	isoniazide, Idragina, Funghi genere Gyromitra. Glicole Etilenico	1 (Entro 30 min.)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Piridossina Cloridrato (vit.B6). RCP AIFA
B02BA01	Fitomenadione Vit.K	Fiala da 10mg/ml	NO	Anticoagulanti warfarinici, dicumarolici, e superwarfarinici. NON INDICATO PER I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI (NAO)	1 (Entro 30 min.)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Fitomenadione (Vit.K). RCP AIFA
V03AB23	N-Acetilcisteina	Fiala da 5g/25ml	NO	Paracetamolo. Funghi contenenti amanitine. Solventi epatotossici. Agenti epatotossici e ossidanti. SONO DISPONIBILI DIVERSE FORMULAZIONI	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	N-Acetilcisteina (HIDONAC), RCP AIFA
B03BB01	Acido folico 15mg/2ml	Fiala da 15mg/2ml	NO	Metanolo. LA FORMULAZIONE FINALE è SOLITAMENTE REPERIBILE ALL'ESTERO	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 30°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Acido Folico. RCP AIFA
V03AF04	Calcio levofolinato Pentaidrato	Flacone da 25mg	NO	metotrexate. Pirimetamina. Trimetoprim	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio Levofolinato P. RCP AIFA
G02CB01	Bromocriptina mesilato	compressa da 2,5mg	NO	Sindrome maligna da neurolettici	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. Conservare al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Bromocriptina M. RCP AIFA
X	Calcio gluconato gel 2.5%	Barattolo 500g	NO	Contatto Cutaneo con floruri e ossalati (antiruggine). SOLO USO CUTANEO	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. Tenere in luoghi asciutti.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio Gluconato (Calcium Gel). Schede
A12AA20	Calcio lattogluconato e calcio carbonato	cpr da 500mg	NO	Ingestione di Floruri. SONO DIPONIBILI FORMULAZIONI ACQUISTABILI ALL'ESTERO	2 (Entro 2 ore)	conservare in luoghi asciutti	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio Lattogluconato e calcio Carbonato
R06AX02	Ciproptadina cloridrato	cpr da 4mg	NO	sindrome serotoninica. USO ORALE	2 (Entro 2 ore)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Ciproptadina Cloridrato. RCP AIFA
R06AX02	Ciproptadina cloridrato	Flacone da 150mg 2mg/5ml	NO	sindrome serotoninica. USO ORALE	2 (Entro 2 ore)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Ciproptadina Cloridrato. RCP AIFA
N05AA01	Clorpromazina cloridrato	Fiala da 50mg/2ml	NO	sindrome serotoninica. USO ENDOVENOSO	2 (Entro 2 ore)	Conservare al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Clorpromazina Cloridrato. RCP AIFA
M03CA01	Dantrolene sodico	Flacone da 20mg	NO	Sindrome maligna da neurolettici	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori ai 25°C. Non esporre alla luce diretta. Impiegare la soluzione entro 6 ore dalla ricostituzione. La soluzione ricostituita non deve essere esposta a temperature inferiori a 15°C e superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Dantrolene sodico. RCP AIFA

V03AB34	Fomepizolo	Fiala da 1,5g/1,5ml	SI	Glicole etilenico. Metanolo.	2 (Entro 2 ore)	Conservare a temperature tra i 20°C e i 25°C	Presente nelle Farmacie Ospedaliere e nelle Rianimazioni. Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Fomepizolo. Scheda Farmaco
X	Frammenti anticorpali antiviperica	Siero per vipera aspis/amm. Berus/ursini	SI	Morso di Vipera europea.	2 (Entro 2 ore)	Conservare a temperature tra 2°C e 8°C.	Presente nelle Farmacie Ospedaliere e nelle Rianimazioni. Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare il CAV
B06AC02	Inibitori C1 esterasi e antagonisti recettori bradichinina (Firazyr)	siringa pre-riempita 30mg/3ml	NO	Terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario. SOTTOCUTANEO	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C. Non congelare.	Presente nelle Farmacie Ospedaliere e nelle Rianimazioni. Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Inibitori C1 esterasi e antagonisti recett
A16AA01	Levocarnitina	fiala da 1g/5ml	NO	Iperammoniemia, epatotossicità da acido valproico e encefalopatia da acido valproico	2 (Entro 2 ore)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	L-Carnitina. RCP AIFA
N07AA01	Neostigmina	Fiala da 0,5mg/1ml	NO	ileo paralitico da anticolinergici curari e altre sintomatologie causati dagli stessi.	2 (Entro 2 ore)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Neostigmina. RCP AIFA
V03AB04	Pralidossima	Flacone 200mg	NO	esteri organofosforici	2 (Entro 2 ore)	Proteggere dalla luce.	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Pralidossima.RCP AIFA
	Siero antibotulinico	Siero antibotulinico	NO	Botulismo.	2 (Entro 2 ore)	Indicazioni Min. Salute	REPERIBILE PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE. Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare il CAV
A05BA03	Silimarina	Flacone da 350mg / bust.200mg	NO	AMANITINE	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti Di Rianimazione. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Silimarina. Scheda Legalon SIL
V03AB35	Sugammadex	Fiala da 200mg 2ml/ 500mg 5ml	NO	Inversione del blocco neuro-muscolare indotto da rocuronio e vecuronio	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 30°C. Non Congelare. Tenere il flacone al riparo dalla luce.	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti Di Rianimazione. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Sugammadex. RCP AIFA
J07BG01	Vaccino Antirabbico	2,5UI/ml	NO	Immunizzazione attiva per la Rabbia	2 (Entro 2 ore)	Conservare a temperature tra 2°C e 8°C. Non congelare	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Vaccino Antirabbico. RCP AIFA
A11BA01	Vitamina B1 tiamina	Fiala da 100mg/2ml	NO	Alcol Etilico. Glicole Etilenico. Ifosfamide	2 (Entro 2 ore)	Nessuna speciale precauzione di conservazione	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Vit.B1. RCP AIFA

A11GA01	Vitamina C acido ascorbico	Fiala da 1g/5ml	NO	mataemoglobinemia	2 (Entro 2 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Vit.C. RCP AIFA
V03AB03	Calcio edetato bisodico (EDTA)	Fiala da 1g/10ml	NO	PIOMBO. RAME. ZINCO. MANGANESE. Alcuni radioisotopi.	3 (Entro 6 ore)	Tenere al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Calcio edetato bisodico.RCP AIFA
V03AC01	Deferoxamina mesilato	Flacone da 500mg/5ml	NO	FERRO E ALLUMINIO	3 (Entro 6 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Deferoxamina mesilato. RCP AIFA
V03AB	DMPS (Dimaval)	Fiala da 250mg/5ml	SI	Mercurio. Piombo. Polonio. Cobalto.	3 (Entro 6 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	DMPS Capsule. SCHEDA
V03AB	DMPS (Dimaval)	capsule da 100mg	SI	Mercurio. Piombo. Polonio. Cobalto.	3 (Entro 6 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	DPMS Fiale. SCHEDA
V03AB36	Fentolamina mesilato	Fila da 10mg/ml	SI	Crisi ipertensiva o Stravaso da agenti vasocostrittori.	3 (Entro 6 ore)	Conservare a temperature tra 15°C e 30°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Fentolamina. Scheda REGITIN
V03AF09	Glucarpidase	fiala da 1000 U.I.	NO	Riduzione di tossicità da Methotrexate in pazienti con insufficienza Renale	3 (Entro 6 ore)	Conservare in frigo a temperature tra 2°C e 8°C	Presente nelle Farmacie Ospedaliere o nei reparti di Oncologia. Seguire le disposizioni del CAV per la somministrazione.	Glucarpidase. Scheda VORAXAZE
H03BA02	Propiltiouracile	compresse da 50mg	NO	Iperitroidismo da Farmaci	3 (Entro 6 ore)	Conservare a temperature tra 15°C e 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Propiltiouracile. Scheda PROPYCIL
X	Siero antimalmignatta	Flacone da 6000 U.I.	NO	VEDOVA NERA. MALMIGNATTA	3 (Entro 6 ore)	Conservare a temperature tra 2°C e 8°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Siero Antimalmignarra. Scheda
V03AB	Succimer DMSA	capsule da 100mg	NO	Arsenico. Lewisiti. Mercurio, Piombo	3 (Entro 6 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare il CAV
B01AE03	Argatroban	flacone da 250mg/2,5ml	NO	Trombocitopenia da eparina. Inibizione diretta della trombina	4 (Superiore alle 6 ore)	Non Congelare. Tenere al riparo dalla luce	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Argatroban. RCP AIFA
V03AB31	Blu di prussia	capsule da 500mg	SI	cesio e tallio.	4 (Superiore alle 6 ore)	Non conservare a temperature superiori a 25°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Blu di Prussia. SCHEDA ANTIDOTUM TH
V03AB	Dietilentriammonio penta acetato di calcio e di zinco Ca-DTPA e Zn-DTPA	Ca-DTPA fiala da 1g/5ml Zn-DTPA fiala da 1055mg/5ml	SI	Americio, Plutonio, curio, californio, berkelio, torio, ittrio. Nuclidi.	4 (Superiore alle 6 ore)	Contattare il CAV	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare il CAV
J06BB05	Immunoglobuline umane antirabbia	Fiala da 300 U.I.	SU	Profilassi rabbia. _	4 (Superiore alle 6 ore)	Conservare in frigo a temperature tra 2°C e 8°C. Non Congelare	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Immunoglobuline umane antirabbia. Sc
J06BB05	Immunoglobuline umane antirabbia	Fiala da 750 U.I.	SI	Profilassi rabbia_	4 (Superiore alle 6 ore)	Conservare in frigo a temperature tra 2°C e 8°C. Non Congelare	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Immunoglobuline umane antirabbia. Sc

M01CC01	Penicillamina cloridrato	capsule da 150mg	NO	Rame, Piombo, zinco, oro, arsenico, cadmio. MORBO DI WILSON. CISTINURIA	4 (Superiore alle 6 ore)	Contattare il CAV	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Contattare il CAV
J07AJ52	Siero antidifterite	fiale da 10000UI/10ml	SI	DIFTERITE. FARMACO ESTERO	4 (Superiore alle 6 ore)	Conservare in frigo a temperature tra 2°C e 8°C. Non Congelare	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Siero Antidifterite. Scheda Diphtheria An
A16AX13	Uridina acetato	Busta da 10g	X	Tossicità da 5-fluoruracile e capecitabina. USO COMPASSIONEVOL CONTATTARE IL CAV	4 (Superiore alle 6 ore)	Conservare a temperature tra 15°C e 30°C	Seguire le indicazioni del CAV per la somministrazione	Uridina acetato. Scheda VISTOGARD